

Outil national d'évaluation du risque de la carie (< 6 ans)

Nom de l'enfant :
Date de naissance de l'enfant :
Date de l'évaluation :

Facteurs	Oui	Non
Nettoyage des dents avec une brosse à dents (ou un linge, dans le cas d'un nourrisson) au moins deux fois par jour par un parent ou le responsable de l'enfant	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)
Exposition quotidienne au fluorure (p. ex. dentifrice fluoré, eau fluorée)	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)
Pratiques d'alimentation (cochez toutes les cases qui s'appliquent) : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alimentation au biberon, enfants de > 12 mois <input type="checkbox"/> Utilisation d'un biberon ou d'un gobelet à bec entre les repas contenant d'autres liquides que de l'eau (boissons gazeuses, jus de fruits, lait, lait au chocolat) <input type="checkbox"/> Utilisation d'un biberon ou d'un gobelet à bec à l'heure du coucher et/ou au moment de la sieste <input type="checkbox"/> Absence d'une routine de soins d'hygiène buccale après l'introduction d'aliments solides (enfants >12 mois) combinée à l'allaitement ou l'alimentation au biberon. <input type="checkbox"/> Consommation de collations ou de boissons sucrées entre les repas (p. ex. biscuits, friandises, céréales sucrées, croustilles, boissons gazeuses, jus de fruits, lait au chocolat) 	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Ménage à faible revenu (difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Plaque visible et/ou résidus alimentaires sur les dents	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Caries visibles (y compris les lésions blanches) et/ou signes de traitements antérieurs de caries dentaires (plombages, couronnes en acier inoxydable, dent extraite)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (0)
Note totale (veuillez additionner les points de chaque colonne)		

Risque carieux global : **Risque élevé** (note ≥ 3) **Faible risque** (note < 3)

RECOMMANDATIONS (Cochez les cases ayant fait l'objet d'une discussion avec les parents/responsables de l'enfant.)

RISQUE ÉLEVÉ

Si le **risque carieux global est élevé**, recommandez les mesures suivantes, *en plus* de celles visant tous les enfants (voir ci-après) :

- En présence de caries, consulter un dentiste pour obtenir des traitements.
- Appliquer du vernis fluoré *aujourd'hui*.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT TOUS LES ENFANTS

- Consulter un dentiste (si l'enfant n'a pas reçu de soins dentaires au cours de la dernière année).

Renseignements et recommandations à l'intention des parents ou des responsables de l'enfant:

- Brosser les dents de l'enfant (< 8 ans) au moins deux fois par jour pendant 2 minutes avec :
 - de l'eau ou un dentifrice non fluoré, seulement pour les enfants de 0 à 3 ans, si la note totale est = 0.
 - un frottis (équivalant à la taille d'un grain de riz) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants âgés de 0 à 3 ans (si la note totale est > 0).
 - une petite quantité (équivalant à la taille d'un pois vert) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants de 3 à 6 ans.
- Réduire ou limiter la consommation de sucre (boissons et collations sucrées).
- Éviter de remplir le biberon ou le gobelet à bec avec un liquide autre que l'eau.
- Retirer graduellement le biberon à partir de l'âge de 12 mois au plus tard.
- Commencer à utiliser un verre ou un gobelet sans couvercle avant l'âge de 12 mois.
- Autre : _____



COMMENTAIRES ADDITIONNELS :

Demande de consultation faite auprès de : _____ **Non requise (l'enfant a déjà consulté un dentiste)**

Signature du fournisseur: _____

18 avril 2023

Outil national d'évaluation du risque de la carie (< 6 ans)
Signes de plaque et de lésions carieuses

Plaque visible et/ou résidus alimentaires



Caries superficielles (lésions blanches)



Caries avancées



Images fournies par le Dr. Robert Schroth

18 avril 2023